



医药卫生类专业技术资格考试推荐辅导用书

护士执业资格考试 习题集（上册）

主 审 倪洪波
主 编 刘爱平 杨 静

理实一体 护资考试轻松过

优势特色

- ◎ 内容简明扼要，实用性强
- ◎ 兼顾重点知识与内容广泛性
- ◎ 细分模块覆盖医学基础课程
- ◎ 五大题型参照护资考试要求



北京出版集团
北京出版社

主 审 倪洪波
主 编 刘爱平 杨 静
副主编 刘丽萍 刘明霞 朱玲莉
编 者 徐 蓉 张梦思 宋 健
史伦梅 张艳荣 刘 甜
李晶晶 罗元元

模块一

内科护理(一)

模块一

内科护理(二)

模块二

外科护理

模块三

妇产科护理

模块四

儿科护理

模块五

基础护理

图书在版编目(CIP)数据

护士执业资格考试习题集:全二册/刘爱平,杨静主编.

--北京:北京出版社,2016.9(2021重印)

ISBN 978-7-200-12484-2

I. ①护… II. ①刘…②杨… III. ①护士—资格考试—习题集 IV. ① R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 224986 号

护士执业资格考试习题集:全二册(上)

HUSHI ZHIYE ZIGE KAOSHI XITIJI QUANERCE

主 编:刘爱平 杨 静

出 版:北京出版集团

北京出版社

地 址:北京北三环中路 6 号

邮 编:100120

网 址:www.bph.com.cn

总发行:北京出版集团

经 销:新华书店

印 刷:定州市新华印刷有限公司

版 次:2016 年 9 月第 1 版 2019 年 8 月修订 2021 年 6 月第 2 次印刷

开 本:787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张:41

字 数:784 千字

书 号:ISBN 978-7-200-12484-2

定 价:108.00 元(全二册)

质量监督电话:010-82685218 010-58572162 010-58572393

扫描二维码 共享立体资源

责任编辑 谢志炫

责任印制 赵天宇

封面设计 燕春莉

资源下载网

<http://www.textbookcenter.cn/>

北京出版社大中专教材网



教材资源网

ISBN 978-7-200-12484-2



9 787200 124842 >

定价:108.00元
(全二册)

模块二

外科护理

WAIKE HULI

北京出版集团
北京出版社

目录

项目一	绪论.....	1
项目二	水电解质及酸碱失衡患者的护理.....	1
项目三	外科休克患者的护理.....	4
项目四	麻醉的护理.....	6
项目五	围手术期患者的护理.....	8
项目六	手术室护理工作.....	11
项目七	外科感染患者的护理.....	13
项目八	损伤患者的护理.....	17
项目九	颅脑疾病患者的护理.....	21
项目十	颈部疾病的护理.....	23
项目十一	胸部疾病患者的护理.....	25
项目十二	腹部疾病患者的护理.....	27
项目十三	骨及关节疾病患者的护理.....	45

项目一 绪论

一、名词解释

外科护理学

二、填空题

外科护理学以 _____、_____、_____、_____，梗阻和结石等外科患者为研究对象。

项目二 水电解质及酸碱失衡患者的护理

一、名词解释

1. 高渗性缺水

2. 等渗性缺水

3. 低渗性缺水

4. 代谢性酸中毒


二、填空题

1. 轻度低钠后患者自觉软弱，头晕，疲乏，手足麻木，但口渴不明显，血清 Na^+ 在 _____ 以下，每公斤体重缺氯化钠 _____ g。

2. 细胞外液中最主要的阳离子是 _____，主要的阴离子是 _____，_____ 和蛋白质；细胞内液中的阳离子是 _____ 和 _____，主要阴离子是 _____ 和蛋白质。


3. 中度缺水患者表现极度口渴，乏力，尿少，眼窝凹陷，皮肤弹性差，缺水量为体重的 _____。

4. 机体主要通过 _____ 来维持体液平衡。



三、单选题


1. 酸中毒时, 血钾浓度的变化趋向是
A. 升高 B. 下降 C. 先低后高
D. 先高后低 E. 不变
2. 高钾血症患者出现心律失常时, 首先的治疗措施是立即注射
A. 5% 碳酸氢钠 B. 10% 葡萄糖酸钙 C. 50% 葡萄糖加胰岛素
D. 生理盐水 E. 利多卡因
3. 开始补钾时, 每小时尿量最少应是
A. 10mL B. 20mL C. 30mL
D. 40mL E. 50mL
4. 关于高渗性缺水, 下列哪项是错误的
A. 中度缺水的缺水量为体重的 4% ~ 6%
B. 血清钠为 150mmol/L 以上
C. 患者通常无口渴
D. 治疗时给予 5% 葡萄糖溶液或低渗盐水
E. 细胞内缺水比细胞外缺水更严重
5. 心电图作为低钾血症的辅助诊断手段, 下列哪项有意义
A. QRS 增宽 B. P-R 间期延长 C. U 波出现
D. T 波高尖 E. 病理性 Q 波
6. 关于低渗性缺水, 下列哪项是错误的
A. 长期胃肠减压或慢性肠梗阻是主要病因之一
B. 对循环血量影响不大
C. 血清钠离子浓度在 135mmol/L 以下
D. 静脉输注含盐溶液或高渗盐水
E. 可由等渗性缺水转变而成
7. 血浆渗透压增高最敏感的临床指标是
A. 口渴 B. 尿少 C. 尿比重增高
D. 皮肤弹性差 E. 烦躁不安
8. 低钾血症常伴有
A. 代酸 B. 代碱 C. 高钙血症
D. 高渗性缺水 E. 呼酸
9. 等渗性缺水的临床特点中, 下列哪项不正确
A. 是外科最常见的一种类型
B. 主要为水和钠的等渗性慢性丧失
C. 首先为细胞外液容量迅速减少最后累及细胞内液
D. 临床既有缺水症状, 也有缺钠症状
E. 可转变为低渗性缺水
10. 低渗性缺水时容易血压下降, 是因为
A. 体液丧失过多 B. 缺钙致血管张力低下
C. 细胞外液减少, 循环血量下降 D. 缺钠
E. 缺钾



11. 血液 pH 的范围是
A. 7 ~ 7.15 B. 7.15 ~ 7.25 C. 7.25 ~ 7.35
D. 7.35 ~ 7.45 E. 7.30 ~ 7.40
12. 高钾血症的早期心电图特征是
A. 出现 U 波 B. T 波高而尖 C. QRS 间期延长
D. P-R 间期延长 E. 病理性 Q 波
13. 代谢性碱中毒引起神经肌肉应激性亢进是因为
A. K^+ 减少 B. Na^+ 减少 C. Cl^- 减少
D. Ca^{2+} 减少 E. Ca^{2+} 增高
14. 代谢性碱中毒的血气分析结果是
A. pH 增高, HCO_3^- 降低 B. pH 增高, HCO_3^- 增高 C. pH 降低, HCO_3^- 增高
D. pH 降低, HCO_3^- 降低 E. pH 降低, H_2CO_3 增高
15. 代谢性碱中毒多见于
A. 幽门梗阻 B. 肠梗阻 C. 肠痿
D. 腹泻 E. 胰痿
16. 代谢性酸中毒的临床表现中, 哪项不正确
A. 面部, 肢体肌肉小抽动 B. 耳前叩击试验阴性
C. 跟腱反射亢进 D. 手足抽搐 E. 呼吸深、快
17. 正常人血液中 HCO_3^-/H_2CO_3 之比为
A. 10 : 1 B. 15 : 1 C. 20 : 1
D. 25 : 1 E. 30 : 1
18. 不能进食的患者, 极度口渴、烦躁、皮肤弹性消失, 24 小时尿量 600mL, 血清钠 152mmol, 最合适静脉滴注
A. 生理盐水 2000mL B. 高分子右旋糖酐 1000mL
C. 平衡液 1500mL D. 5% 葡萄糖溶液 2000mL
E. 5% 葡萄糖盐 2000mL
19. 患者女性, 42 岁。急性肠梗阻 1 天, 大量呕吐, 感口渴、乏力、烦躁不安, 四肢湿冷, 血压 60/40mmHg, 红细胞压积 52%, 血清钠 140mmol/L, 首先应采用的治疗措施是
A. 给氧 B. 快速给予大量高渗葡萄糖液
C. 纠正酸碱失衡 D. 快速输入晶体液补充血容量
E. 快速输入胶体液
20. 患者男性, 40 岁。体重 60kg, 因食管癌饮食困难已 1 月余, 极度口渴, 尿少而色深, 检查: 血压、体温在正常范围内, 眼窝明显凹陷, 唇舌燥, 皮肤弹性差, 其他无特殊, 血清钠未报告, 二氧化碳结合力 40 容积 %, (正常值: 50% ~ 70%), 该患者的水电解质失衡诊断为
A. 轻度高渗性缺水 B. 中度高渗性缺水 C. 重度高渗性缺水
D. 代谢性碱中毒 E. 代谢性酸中毒

四、简答题:

1. 简述等渗性缺水病人的临床表现?



项目三 外科休克患者的护理

一、名词解释


休克

二、填空题


1. _____ 是反映肾血液灌注情况的重要指标, _____ 常是低血容量性休克的最早征象, 也是休克时最为敏感的监测指标。
2. 中心静脉压 (CVP) 正常值为 $5 \sim 10\text{cmH}_2\text{O}$, 低于 $5\text{cmH}_2\text{O}$ 提示 _____, 高于 $15\text{cmH}_2\text{O}$ 提示 _____。
3. 根据休克时微循环变化, 临床上通常分为 3 期: 即 _____、_____ 和 _____。
4. 休克患者的体位应置于下肢抬高 _____, 身体平卧, 头及胸部抬高 _____。
5. 维持有效循环血量的 3 个因素有 _____、_____ 和 _____。

三、单选题

1. 休克代偿期受损最重的脏器是
 - A. 心
 - B. 肝
 - C. 脑
 - D. 肾
 - E. 脾
2. 休克致死的主要原因是
 - A. 血压显著下降
 - B. 尿量逐渐减少
 - C. 肝衰竭
 - D. 微循环障碍，致使肺、肾、心、脑等脏器衰竭
 - E. 呼吸衰竭
3. 早期休克表现是
 - A. 收缩压下降、舒张压下降、脉搏细速
 - B. 收缩压正常、舒张压下降、脉搏细速
 - C. 收缩压正常、舒张压升高、脉搏缓慢
 - D. 收缩压正常、舒张压升高、脉搏细速
 - E. 收缩压升高、舒张压正常、脉搏细速



4. 患者血压 80/76mmHg, 中心静脉压 2cmH₂O, 应考虑为
 - A. 心功能不全
 - B. 血容量严重不足
 - C. 血容量不足与血管张力降低两种都可能
 - D. 血管张力降低
 - E. 补液速度慢
5. 有效循环血量是指
 - A. 维持正常代谢所需血量
 - B. 包括存在于肝、脾和淋巴窦及停滞循环中血量
 - C. 全身血容量
 - D. 单位时间内通过心血管系统进行循环的血量
 - E. 微循环中的血容量
6. 暖休克是指
 - A. 心排血量减少, 周围血管扩张
 - B. 心排血量减少, 小静脉收缩, 小动脉扩张
 - C. 心排血量正常, 小动脉收缩
 - D. 心排血量增多, 微血管扩张
 - E. 体温升高, 微血管扩张
7. 外科常见的休克共同点是
 - A. 由于毒素的作用
 - B. 有效循环血量的急剧减少
 - C. 由于损伤的组织坏死产物的刺激
 - D. 肾上腺皮质功能不全, 应激反应差
 - E. 合并代谢性酸中毒
8. 休克期临床表现, 以下错误的是
 - A. 表现淡漠, 感觉迟钝
 - B. 皮肤黏膜发绀, 出现花斑纹
 - C. 血压下降, 脉搏细速
 - D. 尿量增加
 - E. 体温下降
9. 休克进入微循环衰竭是指
 - A. 毛细血管前括约肌强烈收缩, 动静脉短路开放
 - B. 微动脉和毛细血管前括约肌舒张
 - C. 微静脉收缩, 毛细血管内血液滞留, 血液浓缩
 - D. 出现弥散性血管内凝血, 严重出血倾向
 - E. 毛细血管前括约肌扩张, 毛细血管后括约肌收缩
10. 休克时改善微循环的最主要措施是
 - A. 吸氧
 - B. 强心药
 - C. 肝素
 - D. 扩充血容
 - E. 纠酸
11. 调节休克期补液量与速度, 可靠的指标是
 - A. 尿量
 - B. 血压
 - C. 脉搏
 - D. 中心静脉压
 - E. 神志
12. 感染性休克主要由
 - A. G⁺ 细菌产生内毒素引起
 - B. G⁻ 细菌释放的外毒素引起
 - C. 组织分解代谢产物引起
 - D. G⁻ 细菌释放的内毒素引起
 - E. G⁺ 细菌产生外毒素引起



四、简答题

1. 试述休克的病因有哪些。
2. 休克患者护理过程中需要监测哪些主要指标。
3. 简述失血性休克患者的主要护理措施。

项目四 麻醉的护理

一、名词解释


1. 表面麻醉
2. 局部浸润麻醉
3. 全身麻醉
4. 腰麻

二、填空题

1. 成人择期手术，麻醉前 _____ 小时内禁食， _____ 小时内禁饮，否则麻醉中有发生呕吐和误吸的危险。
2. 常用局部麻醉方法有 _____、_____、_____ 和 _____ 4 种。常用局部麻醉药按化学结构，分别为 _____ 和 _____ 类。
3. 腰麻又称 _____，适应范围是 _____。
4. 蛛网膜下腔阻滞患者，麻醉期间常见并发症有 _____、_____ 和 _____ 等，硬膜外阻滞患者，麻醉期间常见并发症除了上述，还有 _____ 和 _____ 等。
5. 常用的全身麻醉方法有 _____、_____ 和 _____ 等。

三、单选题


1. 成人麻醉前禁食最适宜的时间是
A. 术前 4 小时 B. 术前 6 小时 C. 术前 8 小时
D. 术前 12 小时 E. 术前 24 小时



2. 麻醉前用药时, 下列哪项是错误的
 - A. 高热并心动过速者不用阿托品, 可用东莨菪碱
 - B. 颅内压升高者应禁用吗啡
 - C. 支气管哮喘都应首选用吗啡
 - D. 休克并剧烈痛者, 应给予吗啡类药
 - E. 过度紧张者可给予安定
3. 关于麻醉前的准备, 下列哪项是错误的
 - A. 高热患者, 术要先降温后再手术
 - B. 呼吸道炎症者, 要用抗生素控制后再手术
 - C. 高血压患者, 需给降压药使血压稳定后再手术
 - D. 急症手术应立即进行, 无须任何准备, 以免耽误治疗时机
 - E. 有严重贫血者, 术前输血
4. 麻醉前应用吗啡的目的中, 下列哪项是错误的
 - A. 提高痛阈增强麻醉效果
 - B. 减轻内脏牵拉痛
 - C. 松弛支气管平滑肌, 保持呼吸道通畅
 - D. 减轻全身麻醉药的用量
 - E. 协同用药增强舒适感
5. 麻醉中出现血压下降, 脉搏增快时, 首先应考虑
 - A. 麻醉过浅
 - B. 血管扩张, 回心血量减少
 - C. 血容量不足
 - D. 代谢性碱中毒
 - E. 缺氧与二氧化碳蓄积
6. 麻醉中对呼吸的观察, 主要是
 - A. 潮气量
 - B. 分钟通气量
 - C. 呼吸频率和幅度, 呼吸道通畅度
 - D. 呼吸中的氧和二氧化碳浓度
 - E. 呼吸是否规则
7. 局部麻醉药中毒的症状中, 下列哪项是错误的
 - A. 脑晕, 多语, 烦躁不安
 - B. 频发恶心, 剧烈呕吐
 - C. 四肢抽搐
 - D. 苍白, 脉细弱, 血压下降
 - E. 血压升高
8. 局部麻醉药中毒惊厥时, 首选的解惊厥药是
 - A. 苯巴比妥钠
 - B. 安定
 - C. 硫喷妥钠
 - D. 氯丙嗪
 - E. 阿托品
9. 腰麻后出现头痛的常见原因可能是
 - A. 麻醉平面过高
 - B. 麻醉药物不纯
 - C. 麻醉药物注入过快
 - D. 颅内压力下降
 - E. 穿刺过粗
10. 关于胸外心脏按压术, 下列哪项是错误的
 - A. 患者仰卧于硬板上
 - B. 手掌根部按于心前区
 - C. 使胸骨下陷 3 ~ 4cm
 - D. 成人每分钟按压在 70 次左右
 - E. 可通过触及颈动脉或股动脉搏动来判断按压是否有效

四、简答题

1. 简述局麻醉的种类、代表药。



2. 常用麻醉前用药的分类及各类药物的作用。
3. 简述蛛网膜下腔阻滞的适应证，术后并发症。
4. 硬膜外阻滞后常见哪些并发症，并如何护理。
5. 试述全身麻醉后主要有哪些并发症，该如何护理。


项目五 围手术期患者的护理

一、名词解释

围手术期


二、填空题

1. 胃肠道手术患者术前 _____ 天开始进流质饮食，其他手术患者饮食不必限制，但从手术 _____ 小时开始都应禁食；_____ 小时禁饮。
2. 手术前的常规准备包括 _____、_____、_____、_____、_____。
3. 腹部手术，尤其是胃肠道手术后 _____ 时禁食，第 _____ 天肠功能恢复，肛门排气后，开始进少量流质饮食，增加到全量流质饮食，第 _____ 天开始进半流质饮食，一般在第 _____ 天可改为软质或普食。
4. 全身麻醉未清醒患者，应去枕平卧，头 _____，腰麻患者应 _____，以防头痛，颅脑手术后，如无休克或昏迷，取床头抬高 _____ 卧位；颈、胸手术后采用 _____ 卧位；腹部手术后，取 _____ 卧位；休克患者，应取头和躯干抬高约 _____，下肢抬高的 _____ 位。
5. 术后出血的原因 _____、_____、_____、_____。
6. 切口感染常见的原因有 _____、_____、_____。
7. 切口裂开主要原因有 _____、_____、_____、_____。
8. 血栓性静脉炎常见的原因 _____、_____、_____。
9. 胃肠道术前准备的目的是 _____、_____、_____。
10. 腹部手术备皮范围是以切口为中心 _____ cm。



三、单选题

1. 已确诊为晚期胃癌伴有幽门梗阻及大便隐血(+)，宜行
 - A. 急诊手术
 - B. 择期手术
 - C. 限期手术
 - D. 不宜手术
 - E. 都可以
2. 手术前常规禁食、禁水的主要目的是
 - A. 避免胃膨胀而妨碍手术
 - B. 防止麻醉或手术中的呕吐而引起窒息或吸入性肺炎
 - C. 防止术后腹胀
 - D. 防止术后肠麻痹
 - E. 防止呕吐污染手术台
3. 对高血压较明显的患者的择期手术准备宜
 - A. 如无高血压自觉症状，可不降压
 - B. 使血压下降至正常值下限
 - C. 使血压有一定程度下降
 - D. 使血压降至正常水平
 - E. 继续原来降压治疗就可
4. 手术后出现顽固性呃逆，首先应想到的原因是
 - A. 手术造成膈神经损伤
 - B. 腹膜后血肿刺激腹膜神经丛
 - C. 膈下感染
 - D. 术后肠粘连
 - E. 无特殊，过段时间会自愈
5. 有手术指征的胃小弯较大溃疡患者，患有风心病近日心衰被控制，手术日期至少在
 - A. 3~4周以后
 - B. 2个月以后
 - C. 3个月以后
 - D. 半年以后
 - E. 1年以后
6. 绞窄性疝手术后7天拆线，伤口周围红肿、硬结、但未化脓，按伤口分类及愈合分级记录为
 - A. II乙
 - B. III乙
 - C. II甲
 - D. III甲
 - E. III丙
7. 胃肠道手术后，开始进流质饮食的时间是
 - A. 腹痛消失以后
 - B. 患者思食
 - C. 恶心、呕吐消失以后
 - D. 肛门排气
 - E. 拔胃管以后
8. 术后肺不张的最主要的治疗方法是
 - A. 应用广谱抗生素
 - B. 祛痰药物应用
 - C. 吸氧
 - D. 深呼吸及咳嗽
 - E. 雾化
9. 术后肺不张的最常见原因是
 - A. 由于疼痛不敢咳嗽
 - B. 分泌物积聚，堵塞支气管
 - C. 应用哌啶抑制呼吸
 - D. 呼吸恒定于潮气量通气，致功能性气体交换面积丢失
 - E. 麻醉药物所致
10. 术后恶心、呕吐最常见的原因是
 - A. 颅内压增高
 - B. 麻醉反应
 - C. 水和电解质失衡
 - D. 胃管刺激咽部
 - E. 腹部不适所致



11. 术后尿潴留常见于
 A. 脾切除术 B. 胆囊切除术 C. 腹股沟疝修补术
 D. 肛门直肠手术 E. 剖腹术
12. 糖尿病患者需行大手术, 术前对血糖的处理应是
 A. 控制糖略低于正常 B. 控制血糖于正常 C. 血糖呈轻度升高
 D. 尿糖需阴性 E. 继续原来的降糖治疗则可
13. 某男性患者, 行阑尾切除术, 术后 3 天切口疼痛未减轻, 体温 38.5℃, 应考虑为
 A. 肺炎 B. 泌尿感染 C. 切口感染
 D. 有异物存留 E. 外科手术热
14. 患者男性, 68 岁。行胰十二指肠切除术后第 6 天, 表现烦躁不安, 呼吸急促, 咳嗽, 体温 39.8℃, 脉率 120 次/分, 呼吸 38 次/分, 白细胞 $18 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 89%, 患者术后可能并发
 A. 肺部感染或肺不张 B. 伤口感染 C. 术后水电解质紊乱
 D. 术后切口裂开 E. 尿路感染
15. 某患者急性胆囊切除术后第 3 天进食后出现上腹部饱胀, 呼吸急促、躁动不安, 呕吐频繁, 吐出少量棕褐色液体, 放入胃管后有气体排出并吸棕褐色液体 2000mL, 潜血试验(+), 最可能的并发症是
 A. 粘连性肠梗阻 B. 急性胃扩张 C. 胆道出血
 D. 胃肠道出血 E. 吻合口裂开
16. 70 岁患者, 有冠心病病史, 术前心率为 45 次/分, 手术前应准备
 A. 强心药 B. 降压药 C. 皮下注射阿托品
 D. 注射吗啡 E. 安装永久起搏器
17. 甲状腺腺瘤做甲状腺次全切除术, 术后伤口血肿, 经处理切口愈合, 其手术切口类型与愈合分级为
 A. II 类切口, 甲级愈合 B. I 类切口, 乙级愈合 C. II 类切口, 乙级愈合
 D. I 类切口, 丙级愈合 E. III 类切口, 甲级愈合

四、简答题

1. 急症手术术前做好哪些准备?
2. 术后对切口及引流管如何做好准备?
3. 术后常见的并发症有哪些? 如何处理?

项目六 手术室护理工作

一、名词解释

1. 消毒

2. 灭菌

3. 无菌技术

二、填空题

1. 手术室的设计一般将手术室分为 3 区，即 _____、_____、_____。
2. 常用的引流物有 _____、_____、_____、_____。
3. 常用丝线的粗细以号码表明，号码越 _____，表示越粗，常用的有 1 ~ 10 号线，细线则以零表示，零数越 _____ 缝线越细。
4. 医院首选的灭菌方法是 _____。
5. 煮沸灭菌法适用于 _____、_____、_____ 物品，在水中煮沸至 _____℃ 后，维持 _____ 分钟，即能杀灭芽胞在内的一切细菌。
6. 最常用的手术体位是 _____，截石位适用于 _____ 手术，胸部手术应采用 _____ 位，腰椎手术应采用 _____ 位。
7. 手术人员刷手前应修剪指甲，卷高衣袖至肘上 _____ 处，用肥皂流动水将双手、前臂至肘上 _____ cm 处搓洗。
8. 皮肤消毒范围应距手术切口 _____ cm 的区域，涂擦时，无菌手术切口应由 _____ 消毒，阴道、肛门及感染的切口应由 _____ 消毒。

三、单选题


1. 常规高压蒸气灭菌法消灭芽胞所需最短时间是
A. 1 小时 B. 2 小时 C. 3 小时
D. 30 分钟 E. 40 分钟
2. 手术敷料最好的灭菌方法是
A. 甲醛蒸气熏蒸 B. 高压蒸气 C. 紫外线
D. 乳酸熏蒸 E. 戊二醛浸泡
3. 经高压灭菌后的物品一般可保留
A. 5 天 B. 1 周 C. 2 周
D. 3 周 E. 4 周
4. 最常用的物理灭菌法是
A. 熏蒸法 B. 高温 C. 紫外线
D. X 线 E. 浸泡



5. 下列无菌操作中, 哪项是错误的
 - A. 术者的上肢前臂一旦触及有菌物后, 应更换手套
 - B. 无菌手术单湿渗时, 应加盖无菌单
 - C. 禁止越头部或术者背后传递无菌器械物品
 - D. 坠落在手术台边以下的器械物品, 不准捡回再用
 - E. 无菌物品打开超过 4 小时, 应视为有菌物品
6. 禁用高压蒸气灭菌的物品是
 - A. 金属器械
 - B. 搪瓷类
 - C. 橡胶类
 - D. 碘仿, 苯类
 - E. 纱布
7. 刀剪刀性器械最佳消毒法是
 - A. 2% 碱性液煮沸灭菌
 - B. 高压蒸气灭菌法
 - C. 火焰灭菌法
 - D. 化学药液浸泡消毒法
 - E. 紫外线照射
8. 在高原地区器械灭菌最快, 又保证灭菌质量的方法是用
 - A. 0.5‰ 新洁尔灭溶液浸泡
 - B. 甲醛蒸气熏蒸
 - C. 铝锅煮沸
 - D. 压力锅
 - E. 戊二醛浸泡
9. 植皮时, 供皮区消毒可用
 - A. 2.5% 碘酊
 - B. 0.5% 碘伏
 - C. 70% 乙醇
 - D. 95% 乙醇
 - E. 新洁尔灭
10. 手术中如手套破损或接触到有菌区时
 - A. 重新洗手
 - B. 以碘酒、酒精消毒
 - C. 另换无菌手套
 - D. 再戴一双手套
 - E. 继续手术
11. 术中切开空腔脏器前应先
 - A. 止血
 - B. 用纱布垫保护好周围组织
 - C. 用 70% 乙醇再消毒 1 次
 - D. 挤空脏器内溶液, 并控制好两端
 - E. 腹腔灌洗
12. 有关手术时无菌操作规则, 下列哪项是错误的
 - A. 手术者不能接触腰以下及肩部
 - B. 不可在手术人员背后传递器械
 - C. 手术开始清点器械, 手术结束核对器械无误, 才能关闭切口
 - D. 缝合皮肤前再用碘酒, 乙醇消毒 1 次切口, 以杀灭已入侵的伤口内的细菌
 - E. 掉到手术台面以下的器械不可捡回再用
13. 用化学方法消灭细菌称
 - A. 消毒法
 - B. 灭菌法
 - C. 无菌法
 - D. 隔离法
 - E. 化学法

四、简答题

1. 简述器械护士术前、术中、术后工作内容。
2. 简述巡回护士术前、术中、术后工作内容。
3. 试述手术中应遵循的无菌原则。




项目七 外科感染患者的护理

一、名词解释

1. 外科感染
2. 疖
3. 痈
4. 急性蜂窝织炎
5. 丹毒
6. 脓肿
7. 败血症
8. 破伤风

二、填空题

1. 外科感染按致病菌分为_____、_____。
2. 急性蜂窝织炎的特点是_____、_____。
3. _____、_____可引起下肢丹毒反复发作，并可出现淋巴水肿，甚至橡皮肿。
4. 急性淋巴管可分为_____、_____，丹毒属于_____。
5. 破伤风病原菌为_____，是一种_____。
6. 凡是_____的伤口，_____、_____、_____、_____并混合有其他需氧菌感染造成局部缺氧时，破伤风发生率极高。
7. 破伤风杆菌只在伤口的_____生长繁殖，其产生的_____才是造成破伤风的原因。外毒素有_____和_____2种。
8. 痉挛毒素对_____有特殊的亲和力，是引起_____的主要毒素。溶血毒素可引起_____还可引起_____的损害，所以破伤风是一种_____。
9. 破伤风潜伏期一般为_____天，病程一般为_____周。
10. 破伤风肌肉强直性痉挛一般先由_____开始。以后顺次为_____、_____、_____、_____、_____、_____。
11. 疖、痈、急性蜂窝织炎的致病菌分别为_____、_____、_____。
12. _____、_____、_____是毒血症的3大症状。




三、单选题


1. 破伤风患者出现高热, 提示
 - A. 败血症
 - B. 泌尿系感染
 - C. 肺部感染
 - D. 伤口感染
 - E. 脓肿形成
2. 处理破伤风的伤口时, 下列哪项是错误的
 - A. 彻底清创术
 - B. 3% 过氧化氢溶液冲洗伤口
 - C. 伤口应尽量给予缝合
 - D. 用 1% 高锰酸钾溶液湿敷局部
 - E. 青霉素抗生处理
3. 破伤风患者气管切开的主要指征是
 - A. 呼吸中枢麻痹
 - B. 肺部感染
 - C. 抽搐频繁不宜用药物控制
 - D. 胸腹肌强直, 呼吸受限
 - E. 喉痉挛
4. 关于破伤风治疗原则, 下列哪项是错误的
 - A. 及时正确处理伤口
 - B. 应用抗生素中和毒素
 - C. 应用镇静和催眠药物控制痉挛
 - D. 必要时气管切开保证呼吸通畅
 - E. 扩大创缘
5. TAT 脱敏注射法是
 - A. TAT1mL+ 生理盐水 3mL, 每次半小时皮下注射 1mL, 分 4 次注完
 - B. TAT1mL+ 生理盐水 9mL, 分为 1、2、3、4mL, 每半小时皮下注射 1 针, 分 4 次注完
 - C. TAT1mL+ 生理盐水 2mL, 每次 1 小时皮下注射 0.75mL, 分 4 次注完
 - D. TAT1mL+ 生理盐水 9mL, 分 1、2、3、4mL, 每 1 小时注射 1 针分 4 次注完
 - E. TAT1mL+ 生理盐水 10mL, 分为 1、2、3、4mL, 每 1 小时皮下注射 1 针, 分 4 次注完
6. 应用破伤风抗毒素可采用多种途径, 但除外
 - A. 静脉注射
 - B. 肌内注射
 - C. 蛛网膜下腔注射
 - D. 口服
 - E. 灌肠
7. 接受破伤风自动免疫“基础注射”之后
 - A. 可以获得终身免疫
 - B. 每年仍需接受 1 次重复强化注射
 - C. 每 3 年需接受 1 次重复强化注射
 - D. 每 5 ~ 10 年需接受 1 次重复强化注射
 - E. 每 2 年需接受 1 次重复强化注射
8. 破伤风最可靠的预防方法是
 - A. 注射破伤风外毒素
 - B. 注射血清抗毒素
 - C. 注射破伤风类毒素
 - D. 注射免疫球蛋白
 - E. 清创
9. 破伤风最早出现并有诊断意义的症状是
 - A. 苦笑
 - B. 项强
 - C. 张口困难
 - D. 角弓反张
 - E. 发绀
10. 破伤风患者, 肌肉强烈收缩最早的是
 - A. 面肌
 - B. 背腹肌
 - C. 四肢肌
 - D. 嚼肌
 - E. 膈肌
11. 破伤风的潜伏期平均为
 - A. 24 小时
 - B. 6 ~ 10 天
 - C. 20 天左右
 - D. 1 个月左右
 - E. 6 个小时



12. 诊断败血症的主要根据是
 A. 寒战、高热 B. 皮肤散在出血点 C. 身体有感染病灶
 D. 血培养出致病菌 E. 主诉疼痛、发热
13. 脓血症与败血症、毒血症的主要区别点是
 A. 血细菌、培养阳性 B. 转移性脓肿不断出现 C. 寒战高热
 D. 白细胞升高及核左移 E. 病灶处有波动感
14. 关于革兰氏阳性细菌败血症症状，下列哪项是错误的
 A. 一般无寒战，发热呈稽留热或弛张热 B. 皮疹多见
 C. 易并发心肌炎 D. 感染性休克发生早，血沉下降快
 E. 释放外毒素所致
15. 深部脓肿的主要诊断依据是
 A. 局部有波动 B. 局部皮肤水肿 C. 局部明显压痛
 D. 试验穿刺到脓液 E. 局部皮温高
16. 深部脓肿的临床表现中，下列哪项是错误的
 A. 局部红肿多不明显 B. 有波动感 C. 有全身症状
 D. 穿刺有脓 E. 与正常组织分界清楚，压之剧痛
17. 急性蜂窝织炎与丹毒的临床表现主要不同为
 A. 病变不易局限，扩散迅速 B. 病变与正常组织无明显界限
 C. 附近淋巴结增大 D. 局部疼痛
 E. 无寒战、高热
18. 有关急性蜂窝织炎下列哪项是错误的
 A. 致病菌为溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌
 B. 发生于全身各处皮下组织
 C. 常有化脓
 D. 常可复发
 E. 感染病灶与正常组织分界不清
19. 丹毒为
 A. 急性管状淋巴管炎 B. 急性网状淋巴管炎
 C. 急性蜂窝织炎 D. 急性多发性毛囊炎
 E. 急性淋巴结炎
20. 口底及颌下的急性蜂窝织炎危及生命的并发症是
 A. 颅内化脓性海绵体静脉窦炎 B. 喉头水肿、压迫气管、呼吸困难，窒息
 C. 纵膈化脓感染 D. 化脓性心包炎
 E. 休克
21. 急性蜂窝织炎的主要致病菌是
 A. 金黄色葡萄球菌 B. 大肠埃希菌 C. 铜绿假单胞菌
 D. 溶血性链球菌 E. 厌氧菌
22. 有关痈处理方法哪项是错误的
 A. 中央部坏死组织多应切除 B. 局部处理不易控制宜做切开
 C. 切口与一般脓肿相同 D. 创面大者可择期植皮
 E. 引流管引流



23. 糖尿病患者较易患疔的原因是
A. 血糖过高 B. 营养不良 C. 皮肤的屏障功能差
D. 白细胞功能不良 E. 抵抗力下降
24. 引起疔常见的致病菌是
A. 溶血性链球菌 B. 金黄色葡萄球菌 C. 产气荚膜杆菌
D. 白色葡萄球菌 E. 厌氧菌
25. 关于化脓性海绵体静脉炎的临床表现, 下列哪项是错误的
A. 双侧肢体瘫痪 B. 寒战高热 C. 昏迷
D. 患侧眼部及周围肿胀 E. 局部疼痛、压痛
26. 面部“危险三角区”的感染可引起
A. 化脓性海绵状静脉炎 B. 化脓性海绵状静脉周围炎
C. 化脓性海绵状静脉窦炎 D. 内眦静脉和眼静脉栓塞
E. 休克
27. 疔是指
A. 一个毛囊及其附属皮脂腺的急性化脓感染, 常扩散到皮下组织
B. 多个相邻毛囊及其皮脂腺或汗腺急性化脓性感染
C. 毛囊及其附属腺急性化脓感染并有全身症状
D. 多个疔同时或反复发生在全身各部者
E. 可引起化脓性海绵状静脉窦炎
28. 感染转为慢性结局的主要因素是
A. 人体抵抗力与细菌力处于相持状态 B. 人体抵抗力降低
C. 细菌毒力增大 D. 治疗不当
E. 营养低下
29. 关于链球菌感染下列哪项是正确的
A. 脓汁呈恶臭味
B. 是急性腹膜炎最主要的病菌
C. 常引起疔与疖
D. 可产生溶血素与此同时多种溶解酶使感染易于扩散
E. 是急性蜂窝织炎最主要的致病菌
30. 关于金黄色葡萄球菌感染的特点, 下列哪项是错误的
A. 脓汁为黄色 B. 脓汁稠厚 C. 常引起转移性脓肿
D. 感染容易扩散并缺乏局限化倾向 E. 不臭
31. 选择最理想的抗菌药物应根据
A. 药物的抗菌谱 B. 脓液的性状 C. 联合应用广谱抗菌素
D. 全身症状 E. 药敏试验
32. 患者男性, 15岁。足部裂伤1周, 当时未加处理, 以后局部红肿并流出脓液, 1天前开始突然出现持续性高热, 以后有张口困难, 轻度烦躁不安, 检查: 体温 39.5°C , 脉率 108次/分, 神志清, 面色潮红, 除张口仅有正常一半大小外, 其余均无异常发现, 血液白细胞计数 $18 \times 10^9/\text{L}$, 应考虑为
A. 破伤风 B. 毒血症 C. 脓血症有颅内转移脓肿
D. 化脓性脑膜炎 E. 病毒性脑膜炎



四、简答题

1. 试述急性蜂窝织炎和脓肿的鉴别。
2. 比较疖、痈在临床上有何异同点。
3. 外科感染有何特点?
4. 全身化脓性感染的发病特点是什么?
5. 简述破伤风治疗原则。
6. 如何预防破伤风?

项目八 损伤患者的护理

一、名词解释

1. 创伤
2. 一期愈合
3. 撕脱伤
4. 清创术
5. 清洁伤口
6. 污染伤口
7. 感染伤口
8. 烧伤




二、填空题

1. 不利于创伤修复的因素有 _____、_____、_____、_____、_____、_____等。
2. 按皮肤黏膜完整性是否受损将创伤分为 _____、_____ 2 大类。
3. 创伤的现场急救包括 _____、_____、_____、_____ 等。
4. 临床上将烧伤分为 3 期 _____、_____、_____。
5. 常见的烧伤有 _____、_____、_____、_____。
6. 烧伤深度的判断采用 _____ 法，Ⅰ°烧伤患者感觉 _____，浅Ⅱ°烧伤患者感觉 _____，深Ⅱ°烧伤患者感觉 _____，Ⅲ°烧伤患者感觉 _____。
7. 大面积烧伤早期死亡的主要原因是 _____。
8. 按伤口受细菌的污染程度将伤口分为 _____、_____、_____。
9. 清创时机一般争取在伤后 _____ 小时内清创，伤口污染轻，局部血液循环良好，伤口 _____ 小时内可清创，伤口污染严重，应在 _____ 小时内清创，头皮由于抗感染和愈合力极强，可在伤后 _____ 小时清创，效果多数满意。
10. 清洁伤口可在缝合后 _____ 天换药 1 次，感染化脓伤口，脓液较多时 _____ 换药，保持外层敷料不被分泌物浸湿。
11. 烧伤补液时，晶体液首选 _____、其次选用 _____，胶体液首选 _____。
12. 开放性创伤包括 _____、_____、_____、_____，闭合性创伤包括 _____、_____、_____、_____。
13. Ⅰ°烧伤损伤 _____ 层，浅Ⅱ°烧伤损伤 _____ 层，深Ⅱ°烧伤损伤 _____ 层，Ⅲ°烧伤损伤 _____ 层，甚至达脂肪、肌肉、骨骼。
14. 用绷带包扎头顶和残肢端应采用 _____ 包扎法，包扎小腿应采用 _____ 包扎法，包扎肘关节应采用 _____ 包扎法。

三、单选题

1. 伤口污染轻，清创术可延长时限至
A. 12 小时内 B. 16 小时内 C. 20 小时内
D. 24 小时内 E. 10 小时内
2. 关于烧伤休克期的叙述错误的是
A. 烧伤早期可出现短暂的神经性休克
B. 继而很快出现低血容量性休克
C. 大量体液丢失可造成低钾血症或高渗性脱水
D. 患者面色苍白、四肢湿冷、血压下降、脉搏细数
E. 可先补充平衡盐溶液
3. 烧伤休克期是指伤后
A. 12 ~ 24 小时 B. 24 ~ 48 小时 C. 48 ~ 72 小时
D. 6 ~ 8 小时 E. 10 ~ 20 小时
4. 开水烫伤胸腹部、面部水疱形成，伴剧烈疼痛，其烧伤度为
A. Ⅰ° B. 浅Ⅱ° C. 深Ⅱ°
D. Ⅲ° E. 都不是
5. 大面积烧伤患者的急救错误的是
A. 保护创面，防止污染 B. 预防休克，应用镇痛药物
C. 预防休克，大量饮水 D. 保持呼吸道通畅
E. 流水冲洗创面

6. 一名烧伤患者, 体重 50kg, 其烧伤面积 I °10%, II °30%, III °10%, 输液时除生理需要量外, 第 1 个 24 小时内应补液胶、晶体约
- A. 2500mL B. 3000mL C. 3500mL
D. 2000mL E. 4000mL
7. 烧伤患者第 2 个 24 小时输液量, 应为第 1 个 24 小时输液量的
- A. 总量相同
B. 总量的 1/2
C. 胶、晶体液各 1/2 量, 加生理需要量不变
D. 总量的 1/4
E. 总量的 1/3
8. 大面积烧伤, 休克期输液计划的起算时间应是
- A. 受伤时 B. 入院时 C. 静脉输液开始时
D. 受伤后 8 小时 E. 休克时
9. 成人面部、胸腹部及两上肢全部烧伤, 右腿有小片创面约一手掌大小, 其面积约为
- A. 30% B. 35% C. 40%
D. 24% E. 27%
10. 护理一成年烧伤患者, 在输液观察中, 哪项指标说明有效循环血量尚未补足
- A. 脉搏 130 次 / 分 B. 尿量 40mL / 小时 C. 收缩压 12kPa 以上
D. 中心静脉压 0.5kPa E. 皮肤温暖红润
11. 头面部严重烧伤患者的护理, 错误的是
- A. 应取平卧位 B. 保持耳廓干燥
C. 及时清除眼、外耳道、鼻腔分泌物 D. 可采用暴露疗法
E. 眼药水或眼膏保护角膜, 防止感染
12. 冻伤患者的复温措施正确的是
- A. 热茶 B. 热牛奶 C. 热酒
D. 乙醇擦浴 E. 温水
13. 冻伤患者的复温措施正确的是
- A. 立即火烤 10 分钟后保温
B. 立即热敷
C. 立即浸泡在 38 ~ 42℃ 温水中, 5 ~ 7 分钟后擦干保温
D. 用冷水擦浴或用雪撮擦, 逐渐复温
E. 用力拍打患部
14. 复合性外伤患者出现下列情况, 应首先抢救
- A. 休克 B. 四肢开放性骨折 C. 昏迷
D. 开放性气胸 E. 闭合性气胸
15. 感染伤口的处理原则是
- A. 彻底切除坏死组织 B. 控制感染, 加强换药 C. 彻底清创后缝合伤口
D. 只需用抗生素治疗 E. 取除异物
16. 烧伤后预防败血症的关键是
- A. 正确处理创面 B. 合理使用抗生素 C. 增加营养
D. 必要的消毒隔离措施 E. 功能锻炼



17. 大面积烧伤患者采用暴露疗法错误的是
- 病室内需有消毒隔离措施
 - 室温保持 $37 \sim 38^{\circ}\text{C}$
 - 创面可用电热吹风, 红外线照射使创面干燥结痂
 - 切忌创面持久受压, 经常变换体位和翻身
 - 适合头面会阴部烧伤
18. 大面积烧伤焦痂最佳处理是
- 一定要让焦痂自然脱落后植皮
 - 伤后立即切除全部焦痂
 - 早期积极保痂, 而后分批切除痂皮
 - 手术去痂应在烧伤后 $6 \sim 7$ 天
 - 包扎焦痂
19. 烧伤脓毒症或败血症创面极凶险的征象是
- 创面水肿
 - 颜色转暗加深
 - 焦痂潮湿腥臭
 - 创面出现紫黑色质硬的坏死斑
 - 寒战、高热
20. 下列哪项不是毒蛇咬伤的主要症状
- 吞咽、呼吸困难
 - 伤口麻木, 肿胀较轻
 - 颈项强直, 角弓反张
 - 视物模糊
 - 血压不止
21. 毒蛇咬伤急性中毒期护理, 错误的是
- 密切观察病情变化
 - 卧床休息
 - 创口持续湿敷
 - 抬高患肢
 - 奔跑呼救
22. 毒蛇咬伤后, 首先应
- 缚扎伤肢近心端
 - 局部冷敷
 - 使用蛇药
 - 患肢下垂
 - 卧位休息

四、案例分析题

1. 某成年男性因火灾而致烧伤, 发部创面焦黄炭化、疼痛消失, 右上臂出现小水疱, 痛觉迟钝; 右前臂屈侧大水疱、剧痛, 后背上半部分局部轻度红肿、干燥无水疱、有烧灼感, 左下肢大腿伸侧焦痂炭化, 右臀部小水疱、感觉迟钝, 右足背焦痂出现。

问题:

请计算烧伤面积并判断烧伤的严重程度。


2. 患者周某, 男性, 28 岁, 体重 60kg , 因救火烧伤急诊入院。查体: $T 37.2^{\circ}\text{C}$, $P 90$ 次/分, $BP 13.86/11.73\text{kPa}$, 神志清楚, 烦躁, 痛苦表情, 面、颈、全胸腹、右上肢、左手背、手掌有大小不等水疱, 面部剧烈疼痛, 水疱破裂处基底潮湿, 均匀发红水肿。

问题:

(1) 估计烧伤面积和深度。

(2) 如何输液: ①第一个 24 小时输液总量; ②晶体、胶体、水分各多少 mL ? ③液体输入如何分配?

(3) 输液速度适宜的指标有哪些?



项目九 颅脑疾病患者的护理

一、名词解释

1. 颅内压增高“三主征”
2. “熊猫眼”征
3. 逆行性遗忘

二、填空题

1. 颅内高压三主征是指_____、_____、_____。
2. 颅内压增高的原因分为_____、_____和_____3大类。
3. 头皮血肿分为_____、_____、_____。
4. 颅底骨折分为_____、_____、_____。
5. 颅内血肿依血肿的来源和部位分为_____、_____、_____。
6. 硬膜外血肿典型的意识变化是_____，常见的出血来源是_____。
7. 脑脊液鼻漏者禁忌从_____吸痰，禁忌做_____穿刺。

三、单选题

1. 头皮损伤后出血不易停止的原因是
A. 头皮松弛 B. 头皮血管丰富
C. 头皮表浅3层紧密相连 D. 皮下组织内的血管被结缔组织包绕固定
E. 皮下组织疏松
2. 头皮损伤中最严重的是
A. 裂伤 B. 皮下血肿 C. 撕脱伤
D. 挫伤 E. 骨膜下血肿
3. 急性颅脑损伤在何种情况下切忌腰穿
A. 病情稳定后 B. 怀疑有蛛网膜下腔出血 C. 怀疑有颅内血肿
D. 意识障碍尚未恢复 E. 颅内压增高
4. 脑损伤患者出现中间清醒期，提示有
A. 脑挫裂伤 B. 硬脑膜外血肿 C. 脑震荡
D. 颅底骨折 E. 硬脑膜下血肿
5. 脑挫裂伤与脑震荡可靠的鉴别诊断，主要是依据
A. 临床表现 B. X线检查 C. 脑脊液检查
D. 脑电图检查 E. CT
6. 患者男性，28岁。因汽车撞伤头部发生颅前窝骨折，其护理措施错误的是
A. 床头抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ B. 抗生素溶液冲洗鼻腔 C. 禁忌堵塞鼻腔
D. 禁止腰椎穿刺 E. 保持鼻腔清洁干燥



7. 颅骨骨折时出现熊猫眼征，主要见于
A. 前颅窝骨折 B. 中颅窝骨折 C. 后颅窝骨折
D. 凹陷性骨折 E. 线性骨折
8. 头皮血肿的处理原则，正确的是
A. 均需用切开引流
B. 均需用穿刺抽除积血加压包扎
C. 采用局部适当加压包扎
D. 巨大头皮血肿易引起中线移位故脱水治疗
E. 均伴有全身感染
9. 下列颅脑损伤最急需处理的是
A. 脑震荡 B. 顶部的凹陷骨折，深度达 1.5cm
C. 颅底骨折引起外耳道出血 D. 颅内血肿并脑疝形成
E. 脑挫裂伤
10. 下列哪项不是诊断脑震荡的依据
A. 伤后立即出现意识障碍
B. 伤后逆行性遗忘
C. 意识障碍期间可有皮肤苍白，血压下降，呼吸浅慢
D. 脑脊液红细胞阳性
E. 意识障碍持续时间不超过 30 分钟
11. 急性硬膜外血肿最具特征性的表现是
A. 中间清醒期 B. 两侧瞳孔不对称
C. 骨折线跨过脑膜中动脉沟 D. 进行性意识障碍
12. 头皮撕脱伤的最长清创时间是
A. 4 小时 B. 6 小时 C. 8 小时
D. 12 小时 E. 24 小时

四、简答题

1. 简述实行冬眠低温疗法治疗患者的护理措施。
2. 简述对颅内压增高的患者如何保持合理的体位。
3. 试述脑震荡的主要临床表现。

项目十 颈部疾病的护理

一、名词解释

1. 甲状腺功能亢进症
2. 甲状腺危象

二、填空题

1. 单纯性甲状腺肿的主要病因是_____。
2. 临床最常见的甲亢是_____。计算 BMR 的公式是: $BMR = \frac{1}{100} \times \text{体重} \times \text{基础代谢率}$ 。其正常值为_____, 轻度甲亢为_____, 中度甲亢为_____, 重度甲亢为_____。
3. 甲状腺功能亢进症腺大部切除术后, 如损伤喉上神经内支, 可引起_____, 损伤喉返神经可引起_____, 误切甲状旁腺可引起_____。
4. 甲状腺功能亢进症术后的并发症有_____, _____, _____, _____。
5. 甲状腺大部分切除术后, 最危险的并发症是_____。
6. 抢救甲状腺危象时, 使用_____和_____可使心率减慢, 颤抖等症状减轻。
7. 甲状腺功能亢进症手术后患者, 在术后 2 ~ 36 小时要特别注意观察_____症状。

三、单选题

1. 甲状腺危象的患者首选下列哪种药物治疗
A. 他巴唑 B. 丙基硫氧嘧啶 C. 卢戈液
D. 心得安 E. 甲亢平
2. 浸润性突眼的患者睡觉时最好采取什么体位
A. 平卧位 B. 半卧位 C. 高枕卧位
D. 头低足高位 E. 侧卧位
3. 下列哪项不是甲亢的临床表现
A. 怕热多汗 B. 甲状腺肿 C. 突眼
D. 便秘 E. 失眠
4. 下列哪项是抗甲亢药最严重的副作用
A. 皮疹 B. 腹泻 C. 白细胞下降
D. 粒细胞下降 E. 肝功能下降
5. 下列哪项不是甲状腺危象的诱因
A. 严重感染 B. 服用他巴唑过量
C. 严重精神创伤 D. 甲状腺术中过度受压
E. 手术



6. 放射性碘治疗适用于下列哪项
 - A. 中度甲状腺功能亢进症, 年龄小于 25 岁
 - B. 严重粒细胞缺乏
 - C. 抗甲状腺功能亢进症药过敏患者
 - D. 甲状腺危象
 - E. 重度甲亢者
7. 既能阻断甲状腺激素合成, 又能阻止周围组织中 T₄ 转化为 T₃ 的药物是
 - A. 丙基硫氧嘧啶
 - B. 甲巯咪唑 (他巴唑)
 - C. 卡比马唑 (甲亢平)
 - D. 普萘洛尔 (心得安)
 - E. 甲基硫酸嘧啶
8. 甲状腺功能亢进症患者具有特征性的症状是
 - A. 怕热多汗
 - B. 易激动
 - C. 易饥多食, 但体重减轻
 - D. 疲乏无力
 - E. 突眼
9. 对甲状腺功能亢进症重度浸润性突眼的护理不应
 - A. 抬高头部
 - B. 鼓励多饮水
 - C. 生理盐水纱布湿敷
 - D. 外出时用眼罩
 - E. 局部涂抹眼膏
10. 甲状腺功能亢进症患者服用丙基硫氧嘧啶, 如果发生下列哪种情况, 患者应及时上报
 - A. 嗓子痛、发热
 - B. 痛经、月经过多
 - C. 便秘
 - D. 腹胀
 - E. 恶心、呕吐
11. 抗甲状腺药物硫脲类、咪唑类的主要作用机制是
 - A. 抑制甲状腺激素的合成
 - B. 抑制抗原抗体反应
 - C. 抑制甲状腺激素释放
 - D. 降低外周组织对甲状腺激素反应
 - E. 减少甲状腺血流量
12. 抗甲状腺药物硫脲类、咪唑类的主要不良反应是
 - A. 粒细胞减少
 - B. 血小板减少
 - C. 血红蛋白降低
 - D. 肝功能受损
 - E. 红细胞减少
13. 符合甲状腺功能亢进症高代谢综合征的表现是
 - A. 神经过敏、失眠
 - B. 心动过速、收缩压增高
 - C. 肠蠕动增快、腹泻
 - D. 怕热、多汗、食欲亢进
 - E. 突眼征
14. 甲状腺功能亢进症患者精神、神经系统的特征性表现是
 - A. 神经过敏
 - B. 多言多虑
 - C. 激动易怒
 - D. 手指纤颤
 - E. 烦躁不安
15. 甲状腺功能亢进症患者的饮食护理中, 应除外以下哪项
 - A. 高蛋白
 - B. 高热量
 - C. 高维生素
 - D. 高纤维素
 - E. 清淡易消化
16. 下列哪项不是甲状腺危象的诱因
 - A. 精神刺激
 - B. 急性感染
 - C. 重症患者用硫脲类药物治疗
 - D. 重症患者用 ¹³¹I 治疗
 - E. 术前准备不充分
17. 甲状腺危象的先兆表现是
 - A. T₃, T₄ 升高
 - B. 体温 37.5℃
 - C. 严重呕吐, 腹泻
 - D. 脉率 110 次/分
 - E. 血压升高



四、简答题

1. 甲状腺功能亢进症患者行甲状腺大部切除术后，为何必须床边常规备气管切开包？
2. 甲状腺大部切除术后一旦发生呼吸困难和窒息，你如何针对其不同的原因进行急救处理？
3. 简述甲状腺功能亢进症手术前护理？

项目十一 胸部疾病患者的护理

一、名词解释


1. 反常呼吸
2. 气胸
3. 血胸
4. 闭合性气胸
5. 开放性气胸
6. 张力性气胸
7. 纵膈摆动

二、单选题

1. 以下关于胸部外伤的叙述错误的是
 - A. 闭合性损伤均为轻伤，开放性损伤为重伤
 - B. 胸壁软组织挫伤，单发肋骨骨折为轻伤
 - C. 合并有腹腔脏器损伤，称胸腹联合伤
 - D. 可并发皮下气肿、气胸
 - E. 胸膜腔内积气称为气胸



2. 开放性、张力性气胸最可靠的治疗措施是
 - A. 气管插管后辅助呼吸
 - B. 吸氧
 - C. 多层凡士林纱布封闭胸部伤口
 - D. 清创缝合 + 胸腔闭式引流术
 - E. 急送医院处理
3. 下列哪项不是张力性气胸的临床表现
 - A. 严重呼吸困难
 - B. 紫绀
 - C. 纵膈向患侧移位
 - D. 伤侧肺萎缩
 - E. 叩诊呈鼓音
4. 外伤性血胸的临床表现错误的是
 - A. 中等以上的血胸可致休克
 - B. 咯血明显
 - C. 胸腔穿刺可抽出不凝固血液
 - D. 伤侧胸廓饱满, 气管向患侧移位
 - E. 心界向健侧移位
5. 气管向患侧移位的疾病是
 - A. 急性脓胸
 - B. 慢性脓胸
 - C. 损伤性血胸
 - D. 闭合性气胸
 - E. 肺不张
6. 闭式胸膜腔引流装置下列错误的是
 - A. 全部装置应无菌
 - B. 长管伸入瓶内液面下 3 ~ 4cm
 - C. 短管与胸腔引流管相接
 - D. 水封瓶低于胸腔 60cm 以上
 - E. 正常水柱上下波动 4 ~ 6cm
7. 闭式胸膜腔引流护理的注意事项中, 错误的是
 - A. 保持引流管通畅
 - B. 引流瓶不能高于胸腔水平面
 - C. 观察记录引流液的质、量
 - D. 每周定期更换引流瓶一次
 - E. 妥善固定
8. 下列哪项不是开放性气胸的特点
 - A. 呼吸困难
 - B. 纵膈明显向伤侧移位
 - C. 发绀
 - D. 对侧肺受压
 - E. 纵膈扑动
9. 张力性气胸行闭式引流术, 肺膨胀漏气停止, 拔管最合适的时间是
 - A. 可立即拔管
 - B. 24 小时后拔管
 - C. 48 小时后拔管
 - D. 72 小时后拔管
 - E. 一周后拔管
10. 损伤性血胸, 胸腔内积血不凝固的原因是
 - A. 多种凝血因子的减少
 - B. 胸腔内渗出液稀释
 - C. 主要是凝血酶原减少
 - D. 肺、心脏、膈活动去纤维蛋白作用
 - E. 纤溶系统被激活
11. 损伤性血胸其出血可自行停止者多为
 - A. 肋间动脉出血
 - B. 肺破裂
 - C. 胸廓内动脉出血
 - D. 腔静脉出血
 - E. 腔动脉出血
12. 损伤性、进行性血胸是指
 - A. 胸腔积血 1000mL 以上
 - B. 胸部伤口流血不止
 - C. 胸腔中等量以上积血
 - D. 经输血补液后, 血压不回升或回升后又迅速下降
 - E. 补液后血压恢复正常



四、简答题

1. 叙述乳腺癌的自我检查方法。
2. 列表比较闭合性、开放性、张力性气胸临床特点的差异及急救处理。
3. 试述急性乳房炎的护理。
4. 试述胸腔引流管的拔管指征、方法及注意事项。

项目十二 腹部疾病患者的护理

第一节 腹外疝

一、名词解释

1. 腹外疝
2. 疝环
3. 难复性疝
4. 嵌顿性疝
5. 腹股沟斜疝
6. 腹股沟直疝
7. 绞窄性疝

二、填空题

1. 腹外疝的常见病因是 _____、_____, 典型的腹外疝由 _____、_____, _____、_____ 4 部分组成。



2. 腹股沟斜疝的疝环是 _____, 直疝的疝环是 _____, 股疝的疝环是 _____。
3. 腹股沟斜疝是疝囊由 _____ 经 _____ 突出, 可进入 _____, 疝块外形呈 _____, 疝囊颈位于 _____ 外侧。
4. 腹外疝最常见的疝内容物是 _____、_____。
5. 最常见的腹外疝是 _____, 最易发生嵌顿的腹外疝是 _____。
6. 疝手术后, 在 _____ 时间内避免重体力劳动。

三、单选题

1. 腹外疝最重要的发病原因
 - A. 慢性咳嗽
 - B. 长期便秘
 - C. 腹壁有薄弱点或腹壁缺损
 - D. 经常从事导致腹内压增高的工作
 - E. 妊娠
2. 腹股沟斜疝, 疝内容物最多件的是
 - A. 盲肠
 - B. 阑尾
 - C. 大网膜
 - D. 小肠
 - E. 大肠
3. 关于腹外疝的疝外被盖, 下列哪项是错误的
 - A. 皮肤
 - B. 皮下组织
 - C. 筋膜
 - D. 壁层腹膜
 - E. 肌肉
4. 腹外疝的疝环位置相当于疝囊的
 - A. 低部
 - B. 体部
 - C. 颈体交界部
 - D. 颈部
 - E. 底体交界处
5. 难复性腹外疝是指
 - A. 疝内容物回纳时疼痛
 - B. 疝内容物回纳很慢
 - C. 疝内容物回纳与疝囊粘连
 - D. 疝内容物为美克尔憩室
 - E. 疝块不能完全回纳
6. 发生嵌顿性疝最重要的原因
 - A. 疝内容物大, 疝囊小
 - B. 疝环小, 腹压骤增
 - C. 疝内容物和疝囊粘连
 - D. 疝囊颈部水肿
 - E. 疝内容物坏死
7. 腹外疝嵌顿是指
 - A. 所有不能回纳的腹外疝
 - B. 内容物与疝囊粘连的腹外疝
 - C. 疝囊颈弹性收缩将内容物卡住的腹外疝
 - D. 肠管成为疝囊一部分的腹外疝
 - E. 动脉供血不足导致的
8. 关于腹股沟疝, 下列哪项是错误的
 - A. 斜疝多见于儿童及青壮年
 - B. 直疝疝囊在精索后内方
 - C. 斜疝嵌顿机会较多
 - D. 直疝疝囊颈在腹壁下动脉外侧
 - E. 斜疝疝囊颈在腹壁下动脉内侧
9. 最常见的腹外疝是
 - A. 股疝
 - B. 腹壁切口疝
 - C. 腹股沟疝
 - D. 腹股沟直疝
 - E. 脐疝



10. 腹股沟管的内环位于
A. 陷窝韧带外侧 B. 股静脉内侧 C. 腹壁下动脉内侧
D. 腹壁下动脉外侧 E. 股静脉外侧
11. 绞窄性疝处理原则是
A. 紧急手术 B. 手法复位 C. 支持疗法
D. 抗感染 E. 暂不行手术
12. 腹股沟斜疝与直疝在解剖上的区别, 下列哪项是正确的
A. 斜疝与腹横肌薄弱有关, 直疝与腹内斜肌薄弱有关
B. 斜疝自内环处发生, 沿精索发展; 直疝则由海氏三角处发生, 不沿精索发展
C. 斜疝位于腹壁下动脉内侧, 直疝则位于外侧
D. 斜疝疝囊在精索后方, 直疝在前方
E. 还纳疝块后压迫深还, 直疝疝块不再脱出
13. 关于斜疝, 哪项是错误的
A. 多见于儿童及青年
B. 左侧较右侧多
C. 能否进入阴囊不是与直疝区别的要点
D. 婴幼儿斜疝手术治疗时, 一般不需行修补术
E. 右侧较左侧多
14. 关于腹外疝, 哪项正确
A. 股疝多见于老年男性 B. 腹股沟直疝比斜疝多见
C. 斜疝很少引起嵌顿 D. 直疝很少引起嵌顿
E. 直疝多见于青壮年
15. 护理疝修补术后患者错误的是
A. 鼓励患者早期下床活动 B. 咳嗽时注意保护切口
C. 切口部位压沙袋 D. 术后 3 个月避免重体力劳动
E. 预防腹内压增高
16. 嵌顿疝与绞窄性疝鉴别要点是
A. 疝块不能回纳 B. 疝块是否有压痛
C. 绞窄疝出现休克 D. 绞窄疝内容物发生血液循环障碍
E. 嵌顿后的疝内容物有无静脉回流受阻
17. 斜疝和直疝的最重要鉴别点是
A. 斜疝呈椭圆形或梨形
B. 斜疝肿块常坠入阴囊
C. 回纳疝块后压住内环, 疝块不再突出者为斜疝
D. 以手指插入皮下环, 令患者咳嗽后有冲击感者为斜疝
E. 好发年龄
18. 最易发生嵌顿的腹外疝是
A. 股疝 B. 难复性疝 C. 切口疝
D. 直疝 E. 脐疝
19. 10 个月婴儿患右腹股沟斜疝, 应采取
A. 暂不手术 B. 禁忌手术 C. 紧急手术
D. 择期手术 E. 限期手术



20. 患者男性, 62 岁。5 年来右腹股沟部有一可还纳肿块。查体: 血压 200/120mmHg, 神志清, 右侧肢体失用, 腹部稍胀。右腹股沟扪及 8cm × 5cm × 3cm 大小椭圆形包块, 无压痛及反跳痛, 肠鸣音亢进。应考虑可能为

- A. 难复性腹股沟斜疝 B. 腹股沟淋巴结炎 C. 腹股沟斜疝嵌顿
D. 可复性腹股沟斜疝 E. 绞窄性疝

21. 可避免术后疝复发的术前处理是

- A. 治疗便秘 B. 备皮 C. 灌肠
D. 麻醉前用药 E. 洗胃

四、简答题

1. 列表比较斜疝、直疝的临床特点。

2. 腹股沟斜疝术后, 如何预防阴囊血肿和防止疝的复发?

3. 一名男患者拟行左侧腹股沟斜疝的疝修补术, 于 3 天前入院, 请叙述该患者入院后至术日晨需做哪些护理工作?

第二节、第三节 腹部损伤、急性腹膜炎

一、名词解释

1. 原发性腹膜炎

2. 腹膜刺激征

3. 胃肠减压

二、填空题

- 空腔脏器破裂以 _____ 为主要表现, 实质性脏器破裂以 _____ 为主要表现。
- 继发性腹膜炎常见的病因为 _____、_____、_____、_____。
- 急性腹膜炎的主要症状是 _____、_____、_____, 重要体征是 _____。
- 急性腹膜炎非手术疗法主要有 _____、_____、_____。
- 常见的内脏损伤频率依次为 _____、_____、_____、_____、_____。
- 腹穿穿刺部位是 _____ 或 _____。



三、单选题

1. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的区别是
 - A. 腹痛性质不同
 - B. 感染细菌不同
 - C. 腹胀程度不同
 - D. 腹腔内有无原发病变
 - E. 全身感染现象
2. 急性腹膜炎最主要的症状是
 - A. 腹痛
 - B. 腹胀
 - C. 恶心、呕吐
 - D. 压痛
 - E. 腹泻
3. 急性腹膜炎腹痛的性质是
 - A. 钻顶样的疼痛
 - B. 刀割样疼痛
 - C. 绞痛
 - D. 持续性剧烈疼痛
 - E. 解痉药能使腹痛缓解
4. 诊断急性腹膜炎最可靠的体征是
 - A. 腹胀
 - B. 肝界缩小或消失
 - C. 压痛, 反跳痛和肌紧张
 - D. 肠鸣音减弱或消失
 - E. 腹部立位平片有多个小液平面
5. 急性腹膜炎发生休克的主要原因是
 - A. 大量液体进入腹腔
 - B. 剧烈呕吐造成水分丢失
 - C. 中毒性心肌炎造成心功能不全
 - D. 毒素吸收和血容量减少
 - E. 发热
6. 难以诊断的急性腹膜炎最有价值的辅助检查是
 - A. 腹腔穿刺
 - B. 血常规
 - C. 腹部 X 线平片
 - D. B 超
 - E. 直肠指诊
7. 某患者, 溃疡穿孔术后第 9 天, 体温 38.5℃, 有里急后重, 每次解出少量黏液便, 提示有
 - A. 并发急性痢疾
 - B. 并发急性肠炎
 - C. 盆腔脓肿
 - D. 膈下脓肿
 - E. 直肠癌
8. 急性腹膜炎非手术治疗及护理错误的是
 - A. 严密观察病情变化
 - B. 如无休克, 可取半卧位
 - C. 高质量饮食, 少量多餐
 - D. 大剂量有效抗生素治疗
 - E. 禁食、胃肠减压
9. 关于急性腹膜炎手术指征不正确的是
 - A. 病因不明者
 - B. 伴有休克
 - C. 已趋向局限
 - D. 经非手术治疗无效
 - E. 观察 12 小时症状体征加重
10. 区别空腔脏器与实质性脏器破裂的主要诊断依据是
 - A. 外伤史
 - B. 腹痛的轻重和范围
 - C. 有无移动性浊音
 - D. 腹腔穿刺抽出物
 - E. 有无腹膜刺激征
11. 对疑有内脏损伤的患者的护理错误的是
 - A. 半卧位
 - B. 注意腹部症状和体征
 - C. 避免活动
 - D. 给予流质或半流质饮食
 - E. 注射广谱抗生素
12. 对疑有内脏损伤者在观察期间禁用
 - A. 吗啡、度冷丁
 - B. 阿托品
 - C. 多巴胺
 - D. 抗生素
 - E. 止血敏




13. 护理胃肠减压患者时错误的是
- 及时更换收集瓶，观察并记录吸出液的量和性质
 - 如有阻塞可用注射器以等渗盐水冲洗，保持通畅
 - 持续减压时，应注意口腔护理
 - 如医嘱指定口服经胃管注入药物，则在口服式注入药物后胃肠减压仍应继续进行
 - 维持水电解质平衡
14. 汽车撞伤上腹部4小时，患者面色苍白，四肢厥冷，血压0.79/0.53kPa，脉搏140次/分，全腹轻度压痛、反跳痛与肌紧张，腹部透视无异常，首先应考虑
- 胃破裂
 - 十二指肠破裂
 - 肝脾破裂
 - 腹膜后血肿
 - 小肠破裂
15. 腹部闭合性损伤，在观察期间下列处理错误的是
- 禁食
 - 腹胀时灌肠
 - 不用镇痛药
 - 患者应卧床休息，不能随意搬动
 - 定时测定血压和脉搏
16. 为预防急性腹膜炎并发膈下感染的简单而有效的措施是
- 腹腔引流
 - 半卧位
 - 胃肠减压
 - 应用抗生素
 - 早期活动
17. 脾破裂休克时应
- 一旦确诊立即进行手术
 - 先抗休克待休克好转后再手术
 - 积极抗休克同时积极准备手术
 - 非手术抗休克疗法
 - 以上都不对
18. 乙状结肠破裂，立位腹部平片可在何处出现半月形气影
- 膀胱直肠窝
 - 回盲部
 - 膈下
 - 左侧腹部
 - 右侧腹部

四、简答题

- 为什么急性腹膜炎患者要取半卧位？
- 试述腹部损伤和急性腹膜炎的护理。
- 简述胃肠减压的护理。
- 如何鉴别实质性脏器的空腔脏器损伤？

五、案例分析题

- 患者女性，37岁。上腹剧痛，渐波及全腹2小时，恶心呕吐胃内容物1次，量约200mL，二便正常，既往有溃疡病史3年，查体：T 38.5℃，P 90次/分，



BP 14.3/9.33kPa, 腹平坦, 腹式呼吸消失, 未见肠型及肠蠕动波, 全腹肌紧张如板状, 压痛和反跳痛(+), 以上腹为著; 肝脾触诊不满意, 肝浊音界消失, 移动性浊音可疑; 肠鸣音弱。腹穿抽出含食物残渣的浑浊液体约 1mL。白细胞计数 $12 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 87%; 尿常规无异常。

问题:

- (1) 该患者初步诊断是什么?
- (2) 如需手术治疗, 请拟订术后护理计划。

2. 患者刘某, 男性, 17 岁。由于不慎从高约 2m 的树上跌下, 即感左上腹痛, 可忍受。诊断性腹腔穿刺未抽出任何液体。次日早晨上厕所时突然晕倒, 面色苍白, 四肢冰冷, 脉搏细速, 血压测不到, 腹穿抽出不凝固的血液约 20mL。

问题:

- (1) 患者最可能发生的是什么情况?
- (2) 如需手术治疗, 请拟订术前护理计划。

第四节、第五节 胃十二指肠溃疡、胃癌

一、名词解释


1. 倾倒综合征

2. 毕氏 I 式胃大部切除术

3. 毕氏 II 式胃大部切除术

二、填空题

1. 胃十二指肠溃疡外科手术适应证有 _____、_____、_____、_____、_____。
2. 胃十二指肠溃疡并发瘢痕性幽门梗阻最突出的症状是 _____。
3. 胃十二指肠溃疡急性大出血的主要症状是 _____。
4. 胃大部切除术, 一般 _____ 天可拔除胃管, 术后 _____ 天可改为半流质饮食, 术后 _____ 天可进软食, 一般需 _____ 才能恢复正常的三餐饮食。
5. 胃大部切除术后, 吻合口梗阻, 呕吐物为 _____; 输入段空肠梗阻, 呕吐物为 _____, 输出段空肠梗阻, 呕吐物为 _____。
6. 胃癌多发生于 _____, 其次是 _____、_____。
7. 胃癌早期的临床表现有 _____、_____、_____、_____、_____、_____。



三、单选题

1. 十二指肠溃疡容易发生在
 - A. 十二指肠球部前壁
 - B. 十二指肠降部
 - C. 十二指肠球部后壁
 - D. 十二指肠升部
 - E. 十二指肠球部上壁
2. 胃溃疡的好发部分是
 - A. 胃底部
 - B. 胃大弯
 - C. 贲门部
 - D. 胃小弯
 - E. 胃体
3. 在胃、十二指肠溃疡发生和形成过程中, 肯定无疑的一点是
 - A. 饮食不规律
 - B. 情绪激动
 - C. 饮入过多酒类等刺激物
 - D. 胃酸过多, 激活胃蛋白酶
 - E. 吸烟
4. 溃疡病幽门梗阻的主要临床特点是
 - A. 阵发性绞痛
 - B. 消瘦
 - C. 腹胀伴肠型
 - D. 晚间或下午呕吐过量宿食
 - E. 停止排便排气
5. 胃穿孔的 X 线检查所见主要为
 - A. 双侧横膈抬高
 - B. 膈下游离气体
 - C. 肠管扩张
 - D. 胃内有液平面
 - E. 腹胀伴肠型
6. 溃疡病出血, 患者出现冷汗, 脉搏加速, 呼吸浅促, 血压下降, 出血量多为
 - A. 300 ~ 500mL
 - B. 500 ~ 600mL
 - C. 600 ~ 700mL
 - D. > 800mL
 - E. 400 ~ 500mL
7. 胃溃疡首选的术式是
 - A. 高选择性胃迷走神经切断术
 - B. 毕 I 式胃大部切除术
 - C. 毕 II 式胃大部切除术
 - D. 胃大部切除术 (溃疡旷置)
 - E. 全胃切除术
8. 胃与十二指肠患者外科治疗的绝对适应症是
 - A. 年轻的溃疡病患者
 - B. 并发瘢痕性幽门梗阻
 - C. 并发水肿性幽门梗阻
 - D. 症状轻的十二指肠球部溃疡
 - E. 胃、十二指肠溃疡
9. 有胃痛史 30 年, 钡剂检查证实为胃溃疡患者, 年龄 50 岁, 手术方式宜选用
 - A. 溃疡切除术
 - B. 选择性胃迷走神经切断术
 - C. 全胃切除术
 - D. 胃大部切除术
 - E. 以上都不对
10. 胃、十二指肠溃疡的手术适应症哪项是错误的
 - A. 所有的十二指肠溃疡
 - B. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔
 - C. 胃、十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻
 - D. 胃、十二指肠溃疡大出血
 - E. 胃溃疡恶变
11. 倾倒综合征常发生于
 - A. 迷走神经切断术后
 - B. 毕 I 式胃大部切除术后
 - C. 毕 II 式胃大部切除术后
 - D. 高选择性胃迷走神经切除术后
 - E. 幽门成形术
12. 诊断早期胃癌最可靠的方法是
 - A. 胃肠道钡剂检查
 - B. 纤维胃镜加活检
 - C. 脱落细胞检查
 - D. 超声波检查
 - E. X 线检查
13. 患者男性, 45 岁。上腹痛 10 年, 反酸、嗝气, 进食加重, 服用抗酸药疗效不佳。近两个月来背部也有痛。检查: 消瘦, 剑突下偏左压痛, 胃肠 X 线钡剂检查发现近贲门处



龛影，为圆形，约 1.5cm 大小，边缘平滑，应诊断为

- A. 胃小弯溃疡 B. 胃癌 C. 十二指肠球部溃疡
D. 慢性胃炎 E. 胃大弯溃疡

14. 患者男性，30 岁。酗酒饱餐后 24 小时突发性上腹疼痛，很快扩散致全腹，体检腹部明显压痛，肌紧张，肝浊音界消失，移动性浊音未叩出，肠鸣音消失，平卧位 X 线拍片未发现膈下游离气体，初步诊断是

- A. 急性胰腺炎 B. 绞窄性肠梗阻，肠坏死
C. 急性阑尾炎穿孔 D. 胃或十二指肠溃疡穿孔
E. 胆石症

四、简答题

1. 胃大部切除治疗溃疡的理论根据是什么？
2. 胃癌早期诊断的意义和方法？
3. 毕氏 I 式和毕氏 II 式手术有何不同？各有何优缺点？

五、案例分析题

患者张某，男性，21 岁。诉午餐后上腹剧痛 2 小时余，伴恶心，呕吐。检查：急性痛苦面容，腹肌紧张，全身均有压痛，反跳痛，肝浊音界下移，肠鸣音消失。

问题：

- (1) 你的初步诊断是什么？
- (2) 为了进一步明确诊断，还应进行哪些检查？
- (3) 试述你的治疗方案。
- (4) 制订此病人的护理计划。

第六节、第七节、第八节 肠梗阻、结肠癌直肠癌、阑尾炎

一、名词解释

1. 肠梗阻
2. 绞窄性肠梗阻
3. 粘连性肠梗阻
4. 肠套叠




5. 肠扭转

二、填空题

1. 急性阑尾炎最类型的症状是 _____，其腹部的压痛点称 _____，部位在 _____。
2. 急性阑尾炎最重要的病因是 _____，病理类型有 _____、_____、_____、_____ 4 种。
3. 急性阑尾炎如出现寒战、高热、黄疸，则要考虑 _____ 的可能。
4. 急性阑尾炎术后常见的并发症有 _____。
5. 肠梗阻的症状有 _____。
6. 肠梗阻直肠指检如扪及肿块可能为 _____ 或 _____，也可为 _____，若指套染血，多为 _____。
7. 肠套迭的临床表现是 _____。
8. 小肠扭转时可表现为 _____ 剧烈绞痛，由于小肠系膜被牵扭，可有 _____ 疼痛。
9. 急性肠梗阻非手术治疗适用于 _____ 患者，其治疗措施为 _____。
10. 右半结肠癌的主要表现是 _____；左半结肠癌的主要表现是 _____。
11. 直肠诊断简便有效的检查方法是 _____，最可靠的检查方法是 _____。
12. 大肠癌术前肠管准备有 _____、_____、_____ 3 大措施。
13. 先天性巨结肠的典型表现是 _____。
14. X 线钡剂灌肠检查，在肠套叠患者可见 _____ 阴影，在乙状结肠扭转患者可见 _____ 阴影。

三、单选题

1. 急性阑尾炎的常见致病菌是
 - A. 金黄色葡萄球菌
 - B. 溶血性链球菌
 - C. 大肠杆菌、厌氧菌
 - D. 绿脓杆菌
 - E. 真菌
2. 急性阑尾炎最主要症状是
 - A. 发热
 - B. 恶心、呕吐
 - C. 腹泻
 - D. 转移性右下腹疼痛
 - E. 脉速
3. 急性阑尾炎早期上腹部及脐周围疼痛是由于
 - A. 胃肠道痉挛
 - B. 腹膜炎症刺激
 - C. 内脏神经反射定位不准确
 - D. 阑尾尖端移位所致
 - E. 胃肠道炎性刺激
4. 急性阑尾炎最主要的体征是
 - A. 直肠右前方有触痛
 - B. 右下腹固定而明显的压痛
 - C. 右下腹触及包块
 - D. 腹肌紧张
 - E. 结肠充气试验阳性
5. 患者女性，19 岁。脐周围疼痛 6 小时后转移至右下腹，并伴有恶心呕吐，轻度腹泻，查体：心肺正常，右下腹有明显压痛，轻度反跳痛，白细胞 $14 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 80%，最大可能诊断是
 - A. 胃十二指肠溃疡穿孔
 - B. 急性阑尾炎
 - C. 右侧输尿管结石
 - D. 右侧输卵管破裂
 - E. 宫外孕



6. 有关急性阑尾炎, 错误的是
- 老年人临床表现与病理改变不一致
 - 幼儿易引起穿孔
 - 阑尾炎穿孔后, 腹部X线平片多可见游离气体
 - 妊娠期急性阑尾炎易造成早产或流产
 - 阑尾穿孔可导致弥漫性腹膜炎
7. 急性阑尾炎的护理正确的是
- 确有非手术治疗指征者可用度冷丁镇痛
 - 腹痛突然减轻说明病情好转
 - 腹腔脓肿是术后最常见的并发症
 - 术后鼓励患者早期离床活动
 - 进食高营养饮食
8. 急性阑尾炎的术后护理错误的是
- 切口感染是术后最常见的并发症
 - 早期离床活动可减少发生肠粘连
 - 伤口剧痛应及早拔除腹腔引流管
 - 术后选用有效的抗生素
 - 术后疼痛可用止痛药
9. 阑尾切除术后次日仍未排气、排便应
- 观察
 - 胃肠减压
 - 肌内注射新斯的明
 - 继续使用抗生素
 - 口服导泻剂
10. 常见的机械性肠梗阻是
- 肠粘连
 - 肠套叠
 - 肠痉挛
 - 肠麻痹
 - 肠胀气
11. 肠梗阻护理观察中, 有关呕吐的描述错误的是
- 腹痛早期为反射性呕吐, 多为胃内容物
 - 麻痹性肠梗阻不发生呕吐
 - 绞窄性肠梗阻呕吐物可为血性
 - 低位肠梗阻出现较晚, 呕吐物多为粪便样物
 - 结肠梗阻很少呕吐
12. 对肠梗阻腹胀的观察错误的是
- 肠梗阻均有不同程度腹胀
 - 麻痹性肠梗阻时全腹均匀腹胀
 - 高位肠梗阻时全腹均匀腹胀
 - 肠扭转等闭袢性肠梗阻腹胀多不对称
 - 腹部隆起不对称, 往往是闭袢性肠梗阻的特点
13. 出现绞窄性肠梗阻时, 下列表现不符合的是
- 有明显腹膜刺激征
 - 呕吐物为血性液体
 - 减压后腹痛、腹胀均明显好转
 - 叩诊可有移动性浊音
 - X线显示膨胀突出的肠袢随时间而改变其位置
14. 如肠管绞窄, 胃肠减压抽出液为
- 血性
 - 墨绿色
 - 淡黄色
 - 白色
 - 草绿色
15. 出现早而频繁的呕吐是
- 机械性肠梗阻
 - 高位性肠梗阻
 - 低位性肠梗阻
 - 绞窄性肠梗阻
 - 麻痹性肠梗阻



16. 下列哪项不是麻痹性肠梗阻的表现
 A. 全腹均匀腹胀 B. 肠鸣音亢进 C. 腹痛不明显
 D. 呕吐为溢出性 E. 多不发烧
17. 对肠梗阻的患者, 禁忌做
 A. X 线摄片或透视 B. 肛门直肠指检
 C. 钡剂灌肠造影 D. 钡剂造影 E. 腹部 CT
18. 肠梗阻非手术治疗, 下列措施错误的是
 A. 禁食、胃肠减压 B. 输液、输血 C. 肌内注射阿托品
 D. 应用吗啡 E. 营养支持
19. 肠梗阻非手术疗法的护理错误的是
 A. 保持胃肠减压通畅 B. 观察腹痛、腹围、肠鸣音的变化
 C. 腹痛缓解一定是梗阻解除 D. 警惕出现绞窄征象
 E. 观察肠道排气的情况
20. 术后判断肠管生机与下列哪项指标无关
 A. 肠管颜色、光泽 B. 肠管弹性 C. 肠蠕动
 D. 肠管扩张程度 E. 肠系膜动脉搏动
21. 关于肠扭转的叙述错误的是
 A. 疼痛可放射到腰背部 B. 弥漫性腹胀, 均匀对称
 C. 最常发生的部位在小肠 D. 呕吐后腹痛不减轻
 E. 可引起肠坏死
22. 肠套叠非手术治疗最多采用
 A. 胃肠减压 B. 空气灌肠 C. 钡剂灌肠
 D. 生理盐水灌肠 E. 抗感染
23. 直肠癌的早期症状是
 A. 肛门会阴部疼痛 B. 排便习惯和粪便性质的改变
 C. 大便变细、变形 D. 里急后重
 E. 排便不尽
24. 关于大肠癌术前护理错误的是
 A. 术前期 2 ~ 3 天进流质 B. 服用缓泻药
 C. 术前晚清洁灌肠 D. 一般不留置导尿管
 E. 拟切除肛管直肠者灌肠后坐浴
25. 关于大肠癌术后护理正确的是
 A. 术后立即拔除胃管, 进食
 B. 术后 2 ~ 3 天可灌肠
 C. 施行人工肛门手术的患者, 可较早进半流质及普食
 D. 引流管一般在术后 24 ~ 48 小时拔除
 E. 术后立即拔除尿管
26. 下列哪项不是麻痹性肠梗阻的表现
 A. 腹胀 B. 肠鸣音亢进 C. 无绞痛
 D. 肛门停止排便排气 E. 呕吐
27. 婴儿阵发性哭闹伴呕吐排黏液血粪, 应首先考虑
 A. 嵌顿疝 B. 急性阑尾炎 C. 肠套叠
 D. 细菌性痢疾 E. 肠蛔虫堵塞



四、简答题

1. 试述急性阑尾炎的临床表现。
2. 哪些情况表明你护理的肠梗阻患者已出现肠绞窄的可能?

五、案例分析题

1. 患者男性, 8岁, 家住农村。脐周阵发性腹痛3天, 伴有呕吐多次, 有一次吐出蛔虫。发病以来每天解大便少许, 无发热。检查: 心肺无异常, 除脐左旁可触及能变形的、无触痛的条索状团块外, 余无异常发现, 有轻度脱水征。

问题:

- (1) 本病例考虑为什么病?
- (2) 诊断依据有哪些?
- (3) 如何处理?

2. 患者男性, 20岁。因右下腹痛伴恶心、呕吐24小时急诊入院。现病史: 患者于昨天早饭后感脐周围疼痛, 为持续性钝痛, 不向其他处放射, 无发热、腹泻, 傍晚腹痛转至右下腹, 伴恶心呕吐一次, 为胃内容物。今日上午右下腹痛呈持续性加重, 自觉发热, 既往无特殊病史。检查: T 38.8℃, P 98次/分, R 24次/分, BP 14.7/9.4kPa。外科情况: 腹平坦, 未见肠型及蠕动波, 右下腹肌紧张, 麦氏点有明显压痛及反跳痛, 莫菲征(-), 乙状结肠充气试验(+), 腰大肌试验(-), 肠鸣音减弱。查血: 白细胞 $13 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 85%, 淋巴细胞 15%。


问题:

- (1) 本病的诊断和诊断依据是什么?
- (2) 本病应如何治疗?
- (3) 请制订此患者的护理计划。

第九节 直肠肛管疾病

一、名词解释

1. 痔
2. 内痔
3. 外痔



4. 混合痔

5. 肛裂


6. 肛瘘

二、填空题

1. 肛管直肠环由 _____ 组成，若手术误切断可引起 _____。
2. 大便次数正常而便后滴血，成人常见原因为 _____，发生在小儿应考虑 _____。
3. 血栓性外痔的主要症状是 _____。
4. 肛裂大便出血的特点是 _____。
5. 直肠肛管疾病临床上最常见的检查体位是 _____，侧卧位适用 _____ 患者进行检查。
6. 直肠有管手术 3 天尽量有排便，可口服 _____ 或 _____，每天 2 次，以控制不排便。

三、单选题

1. 关于内痔的叙述错误的是
 - A. 由直肠上静脉丛曲张形成的静脉团
 - B. 内痔也称痔核
 - C. 也属直肠黏膜隆起性病变内痔位于齿状线上方
 - D. 最常见的症状是无痛性间歇性便后鲜血
 - E. 表面覆盖肛管皮肤
2. 哪项不是第一期内痔的临床表现
 - A. 排便时出血
 - B. 肛门无疼痛
 - C. 痔核在大便时脱出肛门外，但能自行回缩
 - D. 肛门指检不能触及痔核
 - E. 间歇性喷射状出血
3. 肛门疼痛，并出现一暗紫色圆形肿块，且有触痛，行走时加重，最大可能是
 - A. 肛周皮下脓肿
 - B. 直肠息肉
 - C. 外痔
 - D. 血栓性外痔
 - E. 十二指肠息肉
4. 下列哪项为非静脉丛曲张引起的痔
 - A. 外痔
 - B. 内痔
 - C. 前哨痔
 - D. 混合痔
 - E. 肛肠痔
5. 有关血栓性外痔的叙述，哪项是错误的
 - A. 肛门处暗紫色半球形肿块，边界清楚
 - B. 肿块表现覆盖直肠黏膜
 - C. 发病突然，疼痛剧烈
 - D. 肿块有明显触痛
 - E. 痔静脉破裂引起的
6. 肛缘后正点中线皮肤的“前哨痔”常提示
 - A. 肛裂
 - B. 肛瘘
 - C. 直肠息肉
 - D. 混合痔
 - E. 脓肿



7. 肛裂的好发部位是
A. 肛管前下中线 B. 肛管后正中线 C. 肛管两侧
D. 肛管前后正中线 E. 肛管左侧
8. 肛裂最主要症状是
A. 大量出血 B. 排便时疼痛，便后缓解
C. 排便时剧痛 D. 排便时，排便后剧烈疼痛
E. 排便前疼痛
9. 肛管直肠周围脓肿最多继发于
A. 肛裂 B. 肛痿 C. 肛窦炎
D. 内痔嵌顿 E. 内痔
10. 肛门坐浴时水温要求在
A. 30℃以下 B. 30℃左右 C. 35℃左右
D. 40 ~ 50℃ E. 20℃左右
11. 下列除哪项外，均属直肠息肉的表现
A. 多见于儿童 B. 常为单发，偶见息肉病
C. 一般为带蒂的圆形肿物 D. 大便次数和性质不正常
E. 存在便血
12. 肥胖患者行肛门直肠镜检查，宜采用
A. 仰卧位 B. 俯卧位 C. 膝胸位
D. 截石位 E. 侧卧位
13. 50 岁患者，素有便秘，每次大便时及便后肛门剧痛，常伴出血，应考虑
A. 肛裂 B. 直肠癌 C. 内痔
D. 外痔 E. 混合痔
14. 40 岁患者，觉肛门异物感已半年，常有便秘，近日突感肛门部肿块增大，有时触痛，应诊断为
A. 内痔脱出 B. 外痔血栓形成 C. 外痔
D. 直肠肿瘤 E. 肛裂

四、简答题

1. 内痔分期，各期有何临床特点？

2. 简述直肠肛管疾病的护理。

第十节 胆石病

一、名词解释

1. 急性胆囊炎

2. 胆石症

3. 莫菲征



4. 夏柯三联症


5. 急性重症胆管炎

二、填空题

1. 急性胆囊炎的主要表现是 _____, 并可向 _____ 放射。
2. 莫菲征是检查 _____ 患者的重要方法。
3. 慢性胆囊炎的主要临床表现是 _____。
4. 胆石的形成主要由 _____ 等原因引起, 按成分可分为 _____、_____、_____ 3 种。
5. 急性重症胆管炎的治疗原则是 _____。
6. 典型的胆道蛔虫病为剑突下呈 _____ 样绞痛, 发作间歇期可 _____。
7. 胆道外科患者宜给予 _____ 饮食, 并要补充 _____。
8. 目前肝、胆、脾疾病的首选检查方法是 _____。
9. 胆道特殊检查法需要禁食 2 小时, 禁水 4 小时的有 _____。
10. 口服胆囊造影的目的是 _____, 静脉胆道造影的目的是 _____。
11. 在进行“T”形开管引流时, 如胆汁量过少, 可能 _____, 量过多, 可能为 _____。胆汁颜色过淡, 表示 _____, 浑浊表示 _____, 有泥沙细渣, 表示 _____。
12. 急性重症胆管炎的临床表现为 _____。

三、单选题

1. 单纯性胆囊炎病理改变正确的是
 - A. 病变扩展到全层胆囊壁
 - B. 胆囊黏膜充血, 水肿和炎症细胞浸润
 - C. 黏膜有散在坏死、溃疡
 - D. 胆囊壁变黑
 - E. 胆囊壁曲张
2. 哪项不是慢性胆囊炎的临床表现
 - A. 心窝部闷胀痛
 - B. 脂肪消化不良
 - C. 胆囊增大, 胆囊积水
 - D. 长期发热
 - E. 右上腹和肩背部隐痛
3. 胆道系统最常见的疾病是
 - A. 胆道蛔虫病
 - B. 急性重症胆管炎
 - C. 急性胆囊炎
 - D. 胆石症
 - E. 慢性胆囊炎
4. 胆总管结石的典型临床表现是
 - A. 恶心、呕吐、腹痛
 - B. 高热、腹痛、白细胞计数增高
 - C. 腹痛、寒战高热和黄疸
 - D. 转移性腹痛、寒战高热和黄疸
 - E. 持续性右下腹疼痛
5. 胆绞痛禁忌使用
 - A. 吗啡
 - B. 阿托品
 - C. 硝酸甘油
 - D. 抗生素
 - E. 哌替啶
6. 急性重症胆管炎, 术前准备不包括
 - A. 补充血容量
 - B. 补充维生素
 - C. 纠正酸中毒
 - D. 硫酸镁利胆
 - E. 术前 1 天晚行清洁灌肠



7. 治疗急性重症胆管炎最关键的措施是
 - A. 大剂量有效抗生素
 - B. 纠正体液失衡
 - C. 及时手术解除胆道梗阻
 - D. 抗休克
 - E. 止血
8. 抗休克急性重症胆管炎的病因应除外
 - A. 胆管结石
 - B. 胆道蛔虫
 - C. 胆管肿瘤
 - D. 胆管痉挛
 - E. 腔内压增高
9. 胆道蛔虫病临床典型症状是
 - A. 上腹胀痛
 - B. 恶心呕吐，吐出蛔虫
 - C. 剑突右下方阵发性“钻顶样”绞痛
 - D. 腹膜刺激征
 - E. 持续性疼痛
10. 胆道蛔虫症除剑突下阵发性“钻顶样”绞痛外，最常伴有
 - A. 发热
 - B. 呕吐
 - C. 黄疸
 - D. 肝大
 - E. 出血
11. 腹痛剧烈，腹部体征轻微是哪项疾病的特点
 - A. 急性胆囊炎
 - B. 慢性胆囊炎
 - C. 胆道蛔虫
 - D. ACST
 - E. 胆管结石
12. 口服胆囊造影剂最主要的目的是
 - A. 观察胆囊形状
 - B. 检查胆囊功能
 - C. 观察胆囊体积
 - D. 观察胆道是否通畅
 - E. 观察胆囊出血
13. 胆道疾病 B 超检查前应
 - A. 禁食、禁水 12 小时
 - B. 禁食、禁水 4 小时
 - C. 禁食 12 小时，禁水 8 小时
 - D. 禁食 12 小时，禁水 4 小时
 - E. 禁食 6 小时，禁水 2 小时
14. “T”形管的护理观察中，哪项不是主要的
 - A. 食欲
 - B. 大便
 - C. 尿量
 - D. 体温
 - E. 引流液的性状
15. “T”形管的护理正确
 - A. “T”形管接管要长，便于患者活动
 - B. 每周更换引流瓶 1 次
 - C. 引流瓶不宜放置地上
 - D. 胆汁量越少，说明胆道越通畅
 - E. 每一天换一次
16. “T”形管造影后正确处理是
 - A. 造影显示胆道通畅无残余结石，开放“T”形管引流胆汁 1～2 天，再行拔管
 - B. 造影后立即拔管
 - C. 造影后，无论有无残石，均可留置一周左右
 - D. 造影后 1～2 天后拔除
 - E. 造影后 4～6 天拔管
17. “T”形管拔除后除观察患者食欲，大便颜色和黄疸消退情况外，同时应注意
 - A. 血压、脉搏
 - B. 有无恶心、呕吐
 - C. 神志
 - D. 有无腹痛和发热
 - E. 呼吸



18. 对胆源性休克患者的治疗措施是

- A. 抗休克治疗
- B. 紧急手术治疗
- C. 抗感染治疗
- D. 抗休克同时紧急手术控制感染
- E. 选择手术治疗

四、简答题

1. 在“T”形管引流的护理中，发现瓶内胆汁极少，你考虑有哪些原因？如何处理？
2. 胆道手术“T”形管起什么作用？
3. 简述胆道疾病特殊检查的护理。

第十一节 泌尿及男性生殖器疾病患者的护理

一、填空题

1. 输尿管全程的3个生理性狭窄分别为_____、_____和_____。
2. 肾损伤按暴力方式和损伤程度可分为两大类，即_____和_____，其中_____在临床上最多见。
3. 膀胱刺激症是指_____、_____和_____。

项目十三 骨及关节疾病患者的护理

一、名词解释

1. 骨折
2. 骨筋膜室综合征
3. 病理性骨折
4. 关节脱位（脱臼）
5. 急性骨髓炎

二、填空题

1. 骨折愈合大体分为 3 个阶段：_____、_____和_____。
2. 根据骨折原因分为_____和_____。
3. 骨折的 3 大专有体征有_____、_____和_____。
4. 骨折的治疗原则是_____、_____和_____。
5. 持续牵引有_____和_____两种，其作用有_____、_____。
6. 桡骨下端骨折，正面观呈_____畸形，侧面观呈_____畸形。
7. 关节脱位的特有体征有_____、_____和_____。
8. 骨折复位固定后，要注意密切观察伤肢远端_____。
9. _____为原发性恶性骨肿瘤中最常见的肿瘤，X 线影像中呈现_____现象。
10. 常见石膏类型有_____、_____、_____和_____。

三、单选题

1. 肱骨中下 1/3 交界处骨折最常见的神经损伤
A. 肌皮神经 B. 桡神经 C. 尺神经
D. 正中神经 E. 肘神经
2. 人体最长、最粗的管状骨是
A. 胫骨 B. 腓骨 C. 髌骨
D. 股骨 E. 尺骨
3. 骨折患者长期卧床不起，易发生的并发症是
A. 坠积性肺炎 B. 肝炎 C. 胆囊炎
D. 心包炎 E. 心包积液
4. 肱骨髁上骨折可伤及的动脉是
A. 腋动脉 B. 股动脉 C. 肱动脉
D. 腘动脉 E. 桡动脉
5. “垂足”说明损伤的神经是
A. 胫神经 B. 腓总神经 C. 腓深神经
D. 腓浅神经 E. 胫总神经
6. 骨折早期功能锻炼的主要形式是
A. 以骨折远端部的关节活动为主
B. 进行伤肢的肌肉舒缩活动
C. 进行全身协调的功能锻炼，并配合理疗和体疗
D. 以肌肉舒张为主
E. 长期卧床休息为主
7. 肱骨中段骨折最易引起损伤的神经是
A. 腋神经 B. 正中神经 C. 尺神经
D. 桡神经 E. 肌皮神经
8. 可引起腓总神经损伤的骨折是
A. 股骨干骨折 B. 股骨髁间骨折 C. 髌骨骨折
D. 腓骨小头骨折 E. 胫骨骨折



9. 右大腿被汽车压伤患者，具备以下哪项可诊断为骨折

- A. 局部高度肿胀和瘀斑 B. 疼痛与压痛明显 C. 下肢不能主动活动
D. 反常活动 E. 水肿明显

10. 下列哪种情况骨折愈合

- A. 胫骨干中，下 1/3 骨折 B. 儿童骨折
C. 牵引过度，骨折段分离移位 D. 软组织嵌入
E. 肌组织损伤

11. 患者女性，45 岁。左胫腓骨下 1/3 开放性骨折，行清创缝合石膏固定治疗，3 个月后局部仍有压痛，X 线显示骨折线尚存在，有少量外骨痂，骨折对位良好，下列哪项是影响骨折延迟愈合的主要因素

- A. 年龄大 B. 开放性骨折 C. 骨折部血液供应差
D. 软组织损伤 E. 闭合性骨折

12. 易并发休克的骨折是

- A. 肱骨髁上骨折 B. 尺桡骨双骨折 C. 股骨干骨折
D. 股骨颈骨折 E. 腓骨骨折

13. 易引起缺血性骨坏死的是

- A. 股骨中段骨折 B. 胫骨中段骨折 C. 股骨颈骨折
D. 肋骨骨折 E. 肱骨中断骨折

14. 前臂缺血性肌挛缩造成的特有畸形是

- A. “锅铲”畸形 B. “枪刺刀”畸形 C. 垂腕畸形
D. 爪形手畸形 E. 反转畸形

四、简答题

1. 简述骨折愈合的 3 个阶段。

2. 简述影响骨折愈合的主要因素。

3. 试述骨折患者的主要临床表现。

4. 试述骨折患者的急救措施。

5. 如何预防牵引患者的并发症。

6. 骨折患者经过手术复位内固定治疗后，应采取哪些主要护理措施？